

# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013  
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO  
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 7 del 28.06.2017

Fase fenologica prevalente: **Ingrossamento acini**

**Trattare**

## FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

(D.M. del 31/5/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite")

In ottemperanza al decreto di lotta obbligatoria ed a seguito dei monitoraggi condotti, si ricorda l'obbligo di effettuare un trattamento

**da Mercoledì 28 Giugno a Mercoledì 5 Luglio**

contro il vettore della malattia con:

**Etofenprox** oppure **Clorpirifos Etile** (preferibilmente in formulazione a granuli idrodispersibili)

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla distribuzione utilizzando alti volumi di acqua, rispettando le dosi ad ettaro consigliate, acidificando la soluzione ed irrorando entrambe le parti del filare.

I trattamenti nelle ore serali sono da preferirsi.

*Si ricorda che è in vigore la Legge Regionale n° 20 del 30/08/98 in materia di salvaguardia degli insetti pronubi per cui è obbligatorio lo sfalcio della vegetazione sottostante in caso di fioriture spontanee evitando fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).*

## PERONOSPORA

**Trattare**

Si consiglia di mantenere la vite protetta da questa malattia con prodotti a base:

**Metalaxil-M + Rame** oppure **Benalaxil-M + Rame**

*Nella scelta del partner di copertura da miscelare, occorre tener presente la limitazione che condiziona l'utilizzo del rame limitandone l'impiego a 6 chilogrammi di sostanza attiva ad ettaro e per annata agraria. Si ricorda che a partire dal 30 Giugno non è più possibile utilizzare i Ditiocarbammati (Mancozeb, Metiram, Propineb) e il Ditianon.*

## OIDIO

**Trattare**

La malattia risulta, sia per la sensibilità della vite in questa fase fenologica, che per l'attuale andamento climatico, di particolare pericolosità. Si consiglia di impiegare in questa fase prodotti a base di

**Ciflufenamid** o di **Metrafenone**. In caso di presenza di sintomi della malattia, si consiglia, prima di intervenire, di contattare il servizio tecnico.

*In caso di necessità è possibile miscelare i prodotti antiperonosporici e antioidici alla soluzione insetticida.*

## MUFFA GRIGIA

**Non Trattare**

**Lotta indiretta:** si consiglia di favorire l'arieggiamento dei grappoli con una razionale potatura verde.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800  
Confagricoltura Alessandria 0142 452209  
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617